

壹、重要行事

【教務處】

【教學組】

1. 本週 9/17(五)發放 110-1 增能補強課程調查表，請於 9/22(三)前班級統一繳交至教務處。
2. 本週 9/17(五)發放 110-1 多元語言課程確認單，請於 9/22(三)前班級統一繳交至教務處

【註冊組】

1. 本週發放學生入學報到時繳交之前一階段畢業證書，學生領回後請自行妥善保存。
2. **新生** 新生學生證將於下週三送印，如有欲更新照片者，請於 9/22(三)前繳交。
3. **高中部** 本週發放 110 學年度免學費補助申請表，請學生及家長簽名後於 9/22(三)繳回導師收集轉交註冊組。
4. **高中升學** 本週進行 111 大學入學考試第一次英語聽力測驗報名，有關升學相關費用，請於週三(9/22)經學藝股長收齊後繳回註冊組，收費金額如下：

項目	費用	說明
第一次英聽報名費	350	測驗日期為 10/23
考試簡章	50	包含英聽、學測、分科考試說明
術科簡章	30	體育/術科/音樂
繁星推薦簡章	80	111 繁星推薦校系及參採項目
個人申請簡章	180	111 個人申請校系及參採項目、二階面試資訊

【輔導室】

- 一、已發下親師座談會暨親師交流信箱調查表，回條請於 9/22(三)繳交回輔導室。

【學務處】

[健康中心]

- 一、請十年級新生於 9/22 以前繳回健康檢查同意書(預計 10/22 由霖園醫院醫療團隊入校進行健康檢查)。
- 二、中學部 BNT 疫苗接種日期預計 10/4(一)下午，確定要接種的學生務必於 9/22 前補繳 BNT 疫苗接種意願書正本以利彙整，並於接種當日攜帶健保卡(以利登錄接種記錄)，當日無意願書正本無法接種。當日未接種者若要補接種，請至 1922 平台預約登記。

三、BNT 疫苗接種後可能會出現發燒不適或接種部位腫痛現象，建議家長可自備退燒相關物品(如：退熱貼或急速冰袋)供孩子不適使用。

四、學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以三天為原則(含接種當日)，必要時得延長。另學生請疫苗假時，需確定家中是否有人陪伴及照顧。

五、住宿生若接種後身體不適可於宿舍區休息，學校會派老師協助支援，若有不適可向支援老師反應

六、【接種後注意事項】

1. 疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失。依據疫苗臨床試驗顯示接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。
2. 接種疫苗後可能有發燒反應(38°C)，一般約 48 小時可緩解。如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
3. 另依據疫苗上市後資料，接種 BNT162b2 疫苗後曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例。主要發生在接種後 14 天內，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性，但評估後 BNT162b2 疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。
4. 接種疫苗後 28 天內若出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀；心悸（心跳不規則、跳拍或“顫動”）；暈厥（昏厥）；呼吸急促或心悸；運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，務必立即就醫。並於就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。
5. 完成疫苗接種後，雖可降低罹患 COVID-19 的機率，但仍有可能感染 SARS-CoV-2，仍需注重保健與各項防疫措施，以維護身體健康。



校園接種COVID-19疫苗常見問答

學生接種疫苗有強制性嗎？

學生接種採自願制，但需經家長同意。

家長需在「COVID-19 疫苗接種通知說明及意願書」上簽選同意且簽名，學生才可施打疫苗，未經同意者不予施打。



如何預防暈針？接種後有甚麼常見反應？

避免空腹或脫水，接種時放鬆心情並採坐姿。

接種後常見反應包含接種部位疼痛、紅腫，其他可能反應如疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失。如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。



接種BNT疫苗後出現哪些症狀要特別注意？

接種疫苗後28天內如出現以下症狀，包括：

胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或“顫動”）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）

應儘速就醫並告知醫師接種史。



中央流行疫情指揮中心

學生接種BNT疫苗後應注意的心肌炎/心包膜炎

• 什麼是心肌炎/心包膜炎？

心肌炎是指心臟肌肉發炎，心包膜炎是包圍心臟周圍的纖維組織發炎。這兩個情況可以單獨或同時發生（心肌心包膜炎）。

• 依據疫苗上市後安全性監測資料，接種BNT疫苗後會出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例。

- 主要發生在接種後14天內（極少數個案發生於接種後2-4週間）
- 較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性。
- 評估後BNT疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。

• 接種疫苗後28天內如出現疑似心肌炎/心包膜炎症狀，應立即就醫：

- 胸痛、胸口壓迫感或不適症狀
- 心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）
- 運動耐受不良（如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯）
- 暈厥（昏厥）
- 呼吸急促

中央流行疫情指揮中心

2021/9/13